

Tannino di Castagno

Corroborante potenziatore delle difese naturali delle piante

COMPOSIZIONE

Composizione p/p

Contenuto percentuale in tannini 0,13%

CARATTERISTICHE

Il Tannino di Castagno è un corroborante ricco di acido acetico, polifenoli e tannini, potenziatore dei meccanismi di difesa delle piante e dell'apparato radicale.

QUANDO USARLO

Intervenire dopo la formazione della 6ª foglia. All'occorenza intervenire dopo la formazione della 2ª foglia. Ripetere ogni 5 - 10 giorni in base alle condizioni stagionali.

In fertirrigazione ripetere ogni 10-30 giorni nell'ultima fase di irrigazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO (per ciclo colturale)

ORTOGARDEN 2-4 ml per 1 L acqua (5 L di soluzione/mq)

ORTOGARDEN 2-2,5 ml per 1 L acqua (trattamento fogliare)

	Concimazione fogliare	Fertirrigazione
Colture orticole	200-250 ml/hl	200 ml/hl
Colture arboree	200-250 ml/hl	200 ml/hl
Ornamentali e Floricole	200-250 ml/hl	200 ml/hl

MISCIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulla colture ridotte prima di estendere il trattamento ed aree più vaste.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti/indumenti protettivi. Eventuali pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e i consigli di prudenza, sono riportati sulla Scheda dati di Sicurezza (SDS) consegnata entro la data di fornitura della sostanza/miscela.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra 5 e 25 °C.



Cucchiaino da caffè = 5 ml



GIARDINO



FIORI IN VASO



TAPPETI ERBOSI



AIUOLE



CESPUGLI



ARBUSTI



ORTAGGI



FRUTTA

CODICE

LG0078

BARCODE



CONFEZIONE

Flacone 250 ml

PEZZI/CART.

Flaconi 30



PERICOLO:

H312 - H315 - H319 - H335

EPOCA D'IMPIEGO

5°C — 25°C

G F M A M G L A S O N D